

Ambulante Flebectomie volgens Muller

Uw arts stelt een speciale operatieve behandeling van uw spatader voor. Deze behandeling heet Ambulante Flebectomie volgens Muller. Onderstaand volgt een uitleg van de behandeling, wat u ervan kunt verwachten en wat de Pellegrinus Kliniek van u verwacht.

Voor de behandeling

- Draag op de dag van behandeling ruime schoenen en kleding. Door de verbandkousen die u na de behandeling aan krijgt, zal strakke kleding mogelijk niet passen.
- Wij adviseren u het te behandelen been te scheren. De steriele doeken worden met kleefstrips aan uw been geplakt. Het verwijderen van deze kleefstrips kan bij beharing pijnlijk zijn.
- Smeer op de dag van behandeling geen lotion of zalf op de benen.
- Als u moeite heeft met stil liggen, geeft u dit alstublieft aan. We zoeken dan samen met u naar een zo prettig mogelijke houding.
- Doordat uw been na de ingreep nog plaatselijk verdoofd is, kan het autorijden bemoeilijken. Neem bij voorkeur iemand mee die u naar huis kan brengen.

De behandeling

De arts tekent met een huidstift de loop van de te behandelen spatader af terwijl u rechtop staat of ligt. Daarna krijgt u enkele prikjes met verdovingsvloeistof die uw huid plaatselijk verdoven. U krijgt dus geen narcose. De arts brengt daarna met een mesje, kleine sneetjes van ongeveer 3 mm in de verdoofde huid. Via deze sneetjes wordt de spatader indien nodig losgemaakt en met een haakje naar buiten getrokken.

Als de spatader is verwijderd worden de sneetjes met een kleine hechtpleister (steristrip) dichtgeplakt. Hechten van de wondjes is bijna nooit nodig. Het gebruik van steristrips geeft een mooiere wondgenezing. De arts of assistente trekt over het behandelde gebied een verbandkous, om de vorming van bloeduitstortingen zoveel mogelijk te beperken. Bij uitzondering kan de arts of assistent besluiten om het gehele been in te zwachtelen.

Mogelijke bijwerkingen van de behandeling

- Bloeduitstorting (blauwe plek) rond het behandeld gebied.
- Blaren/oppervlakkige wondjes door de hechtpleister. Blaren kunnen pijnlijk zijn en er lelijk uitzien, maar verdwijnen vanzelf weer en kunnen verder geen kwaad.
- Donkere verkleuring (pigmentatie) ter hoogte van de wondjes. Deze verkleuring verdwijnt meestal na verloop van tijd. Mensen met een donker huidtype hebben een grotere kans op blijvende pigmentatie.

Na de behandeling

Kousen

Na de behandeling brengt de arts een verbandkous om uw been aan. Deze draagt u gedurende 48 uur dag en nacht en daarna nog 5 dagen alleen overdag, tenzij uw arts anders heeft geadviseerd. De kous mag niet nat worden. Als u wilt douchen, adviseren wij u om een zak om het been te doen en deze af te plakken.

Bewegen

Bewegen is goed, maar met mate. Vermijd de eerste week na de ingreep intensieve sporten zoals wielrennen of hardlopen. Hierna mag u uw normale activiteiten hervatten.

Pijn

Pijn na de ingreep is niet gebruikelijk. Heeft u echter toch pijn, dan mag u maximaal 4x daags 1000 mg paracetamol innemen.

Littekens

Omdat de arts kleine sneetjes maakt is de kans op littekens na verloop van tijd klein. Bovendien schrijft de arts een littekencrème voor. Die kunt u nadat de wond is gesloten op uw been smeren.

Vragen aan de Pellegrinus Kliniek

Heeft u nog vragen of heeft u aanhoudende pijn aan het been, ondanks gebruik van paracetamol, of bij roodheid en/ of zwelling, dan kunt u op werkdagen bellen met de Pellegrinus Kliniek via 010 - 449 33 11. In spoedeisende gevallen kunt u 's avonds en in het weekend contact opnemen met 06 - 30 01 66 20. Aangezien de Pellegrinus Kliniek een samenwerkingsverband heeft met het Erasmus MC, kunt u ook contact opnemen met de dienstdoende dermatoloog van het Erasmus MC via 010 - 463 92 22.